
植物调控内质网胁迫诱导细胞死亡新机制获揭示

作者：writer 来源：爱科学

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/14920.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

植物调控内质网胁迫诱导细胞死亡新机制获揭示。中国科学院华南植物园农业与生物技术研究中心博士后羊玉花和刘旭副研究员在侯兴亮研究员的指导下，研究揭示植物调控内质网胁迫诱导细胞死亡的新机制。相关研究近日在线发表于《植物生理学》。

内质网是细胞内重要的蛋白合成和加工的场所。外界环境胁迫会导致未折叠或错误折叠的蛋白在内质网中积累，从而引起内质网胁迫。为了恢复细胞的稳态和促进生存，未折叠蛋白响应（UPR）信号通路被激活。然而持续的或突发剧烈的内质网胁迫都会激活UPR的末端细胞死亡调控途径诱导细胞死亡。因此，内质网胁迫应答与逆境中植物细胞命运的最终抉择有着重要关系。

研究人员发现在胁迫响应中，一对具有DCD结构域的同源蛋白NRP1（天冬酰胺富集蛋白）和NRP2作为促生存因子抑制植物细胞的死亡。在拟南芥中，NRP1和NRP2功能同时丧失可导致细胞死亡加速，使得植株对内质网胁迫诱导剂衣霉素的耐受性降低，对环境胁迫如高盐 and 高温也更为敏感。表达分析表明，NRP2在内质网胁迫下呈组成型表达，NRP1则可以被迅速诱导上调。

据介绍，拟南芥bZIP60基因编码一个调控UPR的重要转录因子，进一步研究发现，在内质网胁迫下，bZIP60通过直接结合NRP1启动子中的UPR相关元件UPRE-I，激活NRP1的表达，而NRP2的转录则不受其调控。同时，bZIP60调控NRP1的表达并不依赖于经典的IRE1a/b介导的mRNA剪切激活途径。

该研究揭示了一种新的植物生存策略，即在逆境中，通过不同的转录调控激活NRPs途径抑制细胞死亡信号的传输，使植株在不利条件下提高存活的几率。（来源：中国科学报朱汉斌 周飞）

相关论文信息：<https://doi.org/10.1093/plphys/kiab335>

版权声明：凡本网注明来源：中国科学报、科学网、科学新闻杂志的所有作品，网站转载，请在正文上方注明来源和作者，且不得对内容作实质性改动；微信公众号、头条号等新媒体平台，转载请联系授权。邮箱：shouquan@stimes.cn。

作者：羊玉花等 来源：《植物生理学》

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](http://iikx.com)转发