

# 古脊椎所在盔甲鱼类早期演化研究中取得进展

作者：writer 来源：中国科学院

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/14968.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

近日，《历史生物学》（Historical Biology

）在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所硕士研究生孟馨媛和副研究员盖志琨的最新研究成果。该研究报道了在云南曲靖早泥盆世洛霍考夫期（大约4.19亿年前）西山村组中发现的盔甲鱼类三尖鱼科一新属种：刘氏镰角鱼（*Falxcornus*

liui

），属名指示其角与内角组合呈成镰刀状，种名献给了化石的发现者，也是研究盔甲鱼类的第一人——刘玉海先生。刘氏镰角鱼是目前已知的最古老的三尖鱼科成员，它的发现丰富了三尖鱼科的形态特征，为探讨盔甲鱼类在早泥盆世洛霍考夫期的适应辐射提供了关键材料，对研究三尖鱼科的起源、多样性和古地理分布，以及探讨盔甲鱼类角和吻突的形态功能具有重要意义。

最古老和最原始的三尖鱼类

盖志琨介绍说：“镰角鱼在大的分类上属于无颌类盔甲鱼亚纲，目前仅有一块较完整的化石，是刘玉海先生于20世纪80年代在有“古鱼王国”之称的曲靖开展野外考察时发现的，化石的发现地点位于曲靖古城的南城门附近。随着城镇化进程的发展，该区域已变成城市中心的著名文化景点，以后很难再发现新材料了。”盔甲鱼类是一类已灭绝的“戴盔披甲”的甲胄鱼类，目前仅发现于中国和越南北部的志留-泥盆纪地层，具有浓厚的土著色彩。作为有颌类干群的一支，对盔甲鱼类的研究能够帮助学界了解有颌类关键的特征的演化。三尖鱼科隶属于盔甲鱼亚纲真盔甲鱼目，最初发现于广西象州县大乐镇，因模式种大眼三尖鱼（*Tridensaspis*

*magnoculus*

）具有一个尖状吻突与一对侧向延伸的尖角而得名。三尖鱼科是真盔甲鱼目中比较特化的类群，对学界了解早泥盆世盔甲鱼类的辐射演化与生态多样性具有重要意义。然而，由于标本稀少及保存的不完整，目前学界对该科仍知之甚少，尤其是翼角鱼与三尖鱼细长的翼角与吻突的起源和功能一直存在争议。因此，任何有助于了解三尖鱼科形态的信息都可能帮助学界厘清这些问题。

刘氏镰角鱼的发现为解决上述问题提供了新线索。新属种的主要特征是头甲近三角形；吻缘具有明显的吻角但无吻突；具有发育的角和内角，且二者夹角约为90°（呈镰刀状）；中背孔呈裂隙形（长/宽>6）；感觉管系统为典型的真盔甲鱼型；头甲侧缘光滑；头甲纹饰由颗粒状的瘤点组成。为了探究镰角鱼的系统位置，研究人员对以往的矩阵数据进行了扩增，除了镰角鱼，还增加了近期发表的江夏鱼，并运用支序系统学方法对盔甲鱼类的系统发育关系进行了分析。

系统发育分析结果表明，镰角鱼、翼角鱼、三尖鱼共同组成一个单系——三尖鱼科。镰角鱼明显的吻角、角和内角组合呈现的镰刀状，均可作为三尖鱼科重要的鉴别特征。新的分支系统图表明

，镰角鱼代表了目前已知的三尖鱼科的最原始的成员，其吻角和近于90度的镰角很可能指示镰角鱼属（*Falxcornus*）是憨鱼属（*Nochelaspis*）向三尖鱼属（*Tridensaspis*）和翼角鱼属（*Pterogonaspis*）演化的中间过渡类群。研究发现，镰角鱼化石的层位是云南曲靖早泥盆世洛霍考夫期（大约4.19亿年前）西山村组，而三尖鱼科（*Tridensaspidae*）其他两个属——三尖鱼（*Tridensaspis*）和翼角鱼（*Pterogonaspis*）则均来自4.1亿年前的布拉格期。因此，镰角鱼也代表了目前已知的最古老的三尖鱼类。

## 盔甲鱼类在早泥盆世的两次适应辐射

云南曲靖泥盆世的西山村组中的多鳃鱼类十分丰富，目前已发现命名了11个种，被称为多鳃鱼-宽甲鱼组合（*Polybranchiaspis-Laxaspis*）或西山村组合，代表了盔甲鱼类在早泥盆世的第一次适应辐射。

此次辐射以多

鳃鱼目的中背棘的形态多样

性演化最引人注目。例如，除了多鳃鱼（*Polybranchiaspis*）、宽甲鱼（*Laxaspis*）

和坝鱼（*Damaspis*）具有常规的中背棘外，高棘四营鱼（*Siyingia*

*altuspinosa*）和升高耸刺鱼（*Hyperaspis*

*acclivis*）演化出了高耸尖刺状的中背棘；惠清驼背鱼（*Altigibbaspis*

*huiqingae*

）则演化出了刀刃状中背脊。此次在西山村组中发现最古老的三尖鱼类镰角鱼和此前发现的华南鱼类王冠鱼（*Stephaspis*

），表明三尖类和华南鱼类在洛霍考夫期早期就已经开始分化，但直到布拉格期，它们才迎来盔甲鱼类在早泥盆世第二次演化高峰，也是最后一次适应辐射，从此整个盔甲鱼类开始衰落，一直到泥盆纪末期全部灭绝。此次辐射则以吻突和角在真盔甲鱼目、多鳃鱼目和华南鱼目三个主要类群的平行演化为显著特征，演化出形态各异的吻突和角，如鸭吻鱼科（*Gantarostrataspidae*）、三岐鱼科（*Sanqiaspidae*）和三岔鱼科（*Sanchaspidae*）演化出扁平宽大蘑菇状吻突，有时具刺或大结节，三尖鱼科（*Tridensaspidae*）和华南鱼科（*Huananaspidae*）则演化出细长的长矛状吻突，角则演化出侧向延伸类似飞机机翼的翼状角。与之相反的是，布拉格期的多鳃鱼类的多样性突然下降，只有两

种体型特别巨大的多鳃鱼类幸存了下来，分别是来自四川的硕大东方鱼（*Dongfangaspis major*）和来自越南的班润鱼。

## 操控水流的高手？

传统的形态学分析认为盔甲鱼类是游泳能力不强的底栖鱼类，因此，对吻突和角的形态功能存在争议。骨甲鱼类的刺甲鱼、茄甲鱼类、甚至异甲鱼类的两甲鱼和鳍甲鱼也平行演化类似角和吻突的构造。对于这些形态各异的头甲突起的功能，不同的古生物学家有不同的解释，如维持鱼体的平衡、捕食的辅助工具（类似在海底搅动食物的铲子）、特殊的感觉器官、类似船锚的固定作用，以及增大身体尺寸威慑捕食者等，不一而足。近期基于盔甲鱼类的水动力学分析表明，头甲侧向延伸的翼角，可能在水流流过的时候，会增加它们在水中的升力，类似飞机机翼在起飞时的地面效应。这种升力对于披着厚厚的铠甲，但又缺少偶鳍的甲胄鱼类来说至关重要，它能够很好地克服自身的重力，实现更高效的巡游。这表明一些盔甲鱼类可能像骨甲鱼类一样，是主动的游泳者，虽然没有偶鳍，但它们可以采取更多样的运动策略以较好地操纵头甲周围的水流，实现更高的机动性和灵活性。此外，该研究还表明，角与吻突在盔甲鱼类三个主要类群的反复出现，指

示它们可能面临相似的生态压力，从而占据不同的垂直生态位，最终在布拉格期达到演化的顶峰。

研究工作获得国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究计划、中科院战略性先导科技专项（B类）等的资助。

[论文链接](#)








图1 刘氏镰角鱼头甲化石照片及复原图（盖志琨照相，郭肖聪绘）




图2 盔甲鱼亚纲系统发育关系及系统分类（孟馨媛提供）




图3 镰角可能代表了原始的钩角和特化的翼角之间的中间过渡状态（盖志琨照相）



图4 刘氏镰角鱼生态复原图（郭肖聪绘）

研究团队单位：古脊椎动物与古人类研究所

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发