

---

# 科学家揭示裸子植物线粒体丢失基因的进化命运

作者：writer 来源：爱科学

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/15049.html>

*本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！*

科学家揭示裸子植物线粒体丢失基因的进化命运。

近日，中国科学院植物研究所研究员汪小全团队对裸子植物所有13个科的代表性物种进行了DNA和cDNA高通量测序，并对其线粒体基因组进行了拼接，揭示了裸子植物线粒体基因含量的变化及丢失基因的进化命运，并结合已发表的陆地植物线粒体基因组数据，探讨了陆地植物线粒体基因组成差异的影响因子。相关研究成果发表于国际学术期刊《生物医学中心生物学》。

线粒体经内共生事件起源后，丢失了大量的基因，演变为半自主性细胞器。不同生物支系的线粒体基因组差异巨大，尤其是相较于动物和其它真核生物（其蛋白质编码基因含量较稳定），陆地植物的多个支系中线粒体基因的转移/丢失经常发生。因此，植物线粒体编码基因的组成以及丢失基因的进化命运引起了大量关注。

裸子植物代表了种子植物原五大支系的四大支，是被子植物的姐妹类群，包含13个科共约1000余种。以往研究发现，裸子植物的线粒体基因组成在不同支系之间存在非常大的差异，为探讨线粒体丢失基因的进化命运提供了一个良好的体系。

研究人员通过对基因的测序深度及其在基因组中的相对拷贝数、结构、RNA编辑位点、进化速率、GC含量及蛋白质疏水性等方面进行比较分析发现，苏铁类、银杏和松科植物的线粒体基因组编码全部41个蛋白质编码基因，而Conifer II（除松科外的其它松柏类植物）和倪藤类植物的线粒体基因数目大幅减少。在Conifer II中，线粒体基因的转移非常频繁，但直接丢失很少发生；在倪藤类植物中，线粒体基因的转移和丢失均非常频繁。在Conifer II和倪藤类中，有五个相同的基因转移到核基因组，但这些基因的转移是在两个支系各自的共同祖先中独立发生的。

此外，研究人员还发现，与被子植物中的线粒体基因转移/丢失事件（通常发生在某个属甚至某个种中）相比，在裸子植物中（除麻黄属外），大部分线粒体基因转移/丢失事件发生得非常早

---

。根据转移基因的RNA编辑位点分布及内含子数目和相位的差异，研究人员推测Conifer II和倪藤类植物的线粒体基因可能通过两步转移机制进行转移，即反转录转座和后续DNA介导的基因转移。

基于此次研究获得的裸子植物线粒体基因数据，研究人员结合已发表的陆地植物线粒体基因组进行综合分析后发现，基因长度、GC含量、疏水性和核苷酸替代速率可能与陆地植物线粒体基因组的基因组成差异相关。

中科院植物研究所已毕业的博士生阚胜龙为论文第一作者，研究员汪小全和冉进华为共同通讯作者。该研究得到了中科院前沿科学重点研究计划、国家重点研发计划专项、国家自然科学基金和中国科学院青年创新促进会等项目的支持。（来源：中国科学报田瑞颖）

相关论文信息：<https://doi.org/10.1186/s12915-021-01096-z>

版权声明：凡本网注明来源：中国科学报、科学网、科学新闻杂志的所有作品，网站转载，请在正文上方注明来源和作者，且不得对内容作实质性改动；微信公众号、头条号等新媒体平台，转载请联系授权。邮箱：shouquan@stimes.cn。  
作者：汪小全等 来源：《生物医学中心生物学》

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发