
研究发现银屑病发病关键物质

作者：华义 来源：新华社

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/1636.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

日本一项新研究发现，在银屑病的发病机制中，皮肤细胞内一种信号分子发挥了关键作用，在此基础上有望开发出新的治疗方法。

银屑病俗称牛皮癣，是一种与免疫异常有关的皮肤病，表现为皮肤上出现红斑、银屑和瘙痒等。据研究人员介绍，银屑病患者约占全球人口总数的约3%，近年来的注射抗体疗法虽有不错效果，但是治疗费用高昂，部分患者还会出现抗体失效情况。

京都大学等机构研究人员在新一期美国《临床检查杂志·观察》上发表报告说，皮肤细胞内的一种信号分子TRAF6在银屑病发病机制中起着关键作用。

在小鼠实验中，缺失这种信号分子的小鼠不会患银屑病。即便对这些小鼠注射免疫调节因子，诱发本来可导致银屑病的免疫异常现象，银屑病依然被抑制。

研究人员因此认为，可以针对这种信号分子开发新的治疗银屑病方法，从而解决此前相关疗法中存在的难题。(来源：新华社 华义)

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发