
研究发现种子功能性状与植物分布区大小的关系

作者：writer 来源：科学网

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/20660.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

研究发现种子功能性状与植物分布区大小的关系。种子植物是地球上最繁盛的植物类群，也是陆地生态系统中最重要生产者，但种子植物的不同类群在陆地的分布存在巨大差异。近日，中国科学院昆明植物研究所研究员李德铎团队和高连明团队与加拿大阿尔伯塔大学教授何芳良、美国哥伦布州立大学教授Kevin S. Burgess合作，共同揭示了种子植物分布区大小与种子关键功能性状、系统发育之间的关系。相关研究成果发表在《生物地球科学》。

种子是植物可移动的生活史阶段，参与扩散、定植等制约分布的关键生态过程，种子的功能性状与植物分布区有何关系值得深入探讨。例如菊科植物千里光属有些物种的分布区可达上千万平方公里，而中国西南山地一些特有的凤仙花属物种只限于不足一平方公里的分布区。

科研人员基于中国西南野生生物种质资源库收集的122科501属1426种植物种子功能性状数据，并补充了英国千年种子库的部分种子功能性状数据，结合公共数据库获取的植物分布信息和被子植物系统发育树关系，借助最小二乘系统发育回归、变异分解等分析方法探究了种子植物分布区大小与种子关键功能性状、系统发育之间的关系。



独龙凤仙花 陈凯摄



菊科植物千里光 高连明摄

研究表明，种子植物的分布区大小存在显著的系统发育信号，排除系统发育信号后，种子越小，植物分布区面积则越大；种子大小的变异性对植物分布具有一定的正效应，并且种子大小与种子传播方式交互影响植物的分布。整体而言，系统发育、种子大小及其变异性、传播方式共同解释了46.82%的物种分布区变异。该研究对理解种子功能性状和系统发育如何影响植物分布区大小提供了新案例。(来源：中国科学报高雅丽)

相关论文信息：<https://doi.org/10.5194/bg-19-4801-2022>

作者：李德铎等 来源：《生物地球科学》

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发