
研究揭示甲病毒的新型受体识别模式及跨物种传播机制

作者：writer 来源：中国科学院

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/22938.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

研究揭示甲病毒的新型受体识别模式及跨

物种传播机制。

4月24日,《细胞》(*Cell*)在线发表了中国科学院生物物理研究所章新政课题组和清华大学医学院向烨课题组合作完成的研究论文(*Structure of Semliki Forest virus in complex with its receptor VLDLR*)。

该工作解析了SFV与人源受体VLDLR复合物的高分辨率冷冻电镜结构,鉴定了一种甲病毒全新的受体结合位点,揭示了受体VLDLR的多个相似串联结构域通过协同作用与SFV特异性结合的新型机制。该研究首次阐释了通用受体分子介导病毒实现跨物种传播的分子机制,为抗病毒药物设计及新型疫苗开发提供了新靶点。

甲病毒(alphavirus)是一类由蚊虫等节肢动物传播的、有囊膜、单链、正义RNA病毒,属于披膜病毒科(Togaviridae),能广泛感染人、鸟、鼠、马等多种动物并引起相关疾病。甲病毒感染人类后可引起发烧、严重且持续的头痛、肌肉疼痛和关节痛。一些甲病毒能感染神经细胞并导致中枢神经系统感染,引发重症脑炎。迄今为止,尚无任何药物或者疫苗被批准用来治疗或者预防甲病毒的感染。近年来,关于甲病毒侵染机制的研究已有系列重要进展。基孔肯雅热病毒(CHIKV)与其受体Mxra8(matrix remodeling associated protein 8)结合的分子机制和委内瑞拉马脑炎病毒(VEEV)与其受体LDLRAD3(Low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3)结合的分子机制均已清晰阐明。然而,根据现有研究尚不能解释甲病毒能广泛感染从非脊椎动物到脊椎动物、且进化关系上跨度很大的多种物种的原因。2021年有研究报道表明载脂蛋白受体VLDLR(very-low-density lipoprotein receptor)是多种甲病毒,包括塞姆利基森林病毒(Semliki Forest Virus, SFV),感染蚊虫、鼠、马、人等多个物种的通用受体。介导病毒跨越差异较大的不同物种之间传播的通用受体鲜有报道,病毒与这类受体的结合模式及其介导的跨物种传播机制尚不清楚。

甲病毒囊膜表面有80个三聚体形式的刺突蛋白spike,每个spike由三个E1/E2异源二聚体构成。已有研究普遍认为,位于Spike近囊膜区域的E1主要负责病毒与宿主的膜融合,而位于病毒远离囊膜区域spike上的E2参与受体结合。CHIKV与MXRA8复合物和VEEV与LDLRAD3复合物结构研究发现,LDLRAD3和MXRA8均结合在病毒spike上相邻E1-E2二聚体形成的狭缝中,病毒的E1、E2蛋白均参与与受体的结合。本研究利用基于分块重构算法的单颗粒冷冻电镜技术,解析了SFV VLP及其与受体VLDLR复合物的高分辨率结构,发现了VLDLR结合在SFV E1蛋白贴近囊膜区域的DIII结构域(E1-DIII)上且SFV E2没有参与和受体VLDLR的结合。这种结合方式与以往发现的甲病毒受体结合方式不同,刷新了关于甲病毒与受体相互作用的认知。

研究进一步发现，VLDLR通过其胞外多个富含半胱氨酸重复序列结构域（LDLR class A repeats, LAs）与SFV E1-DIII结合。单个LA结构域与病毒的结合力弱，其解离常数为1-30 M，而多个串联LA结构域与病毒的结合显著增强，其解离常数为1-100 nM。SFV表面受体结合位置E1-DIII在二次轴、五次轴附近相互靠近且密集排布，为多个LA结构域可能的协同结合提供了先决条件。研究通过解析SFV VLP与多个串联LA复合物结构发现，多个串联的LAs可同时结合SFV VLP多个E1-DIII位点，且并非以一种固定的模式结合，而是存在多种不同的结合模式（图1）。在五次轴附近，多个串联LAs发生轻微的旋转以避免空间上的阻碍并协同结合E1-DIII。与单个LA结合时相比，串联形式中的LA虽然在转动过程中大部分与E1-DIII的相互作用会被破坏，但是一些关键位点上的相互作用依旧保留，而且通过串联LAs的协同作用，弥补了单个LA上非关键性相互作用的损失，增强了病毒与受体的结合力。从而，这种多个串联LA协同作用模式能够增加受体对单个LA中结合能力丢失的容忍度。不同物种VLDLR大多数LA序列虽然差异较大，但与病毒作用关键残基W132、E137和D139完全保守。VLDLR独特的协同结合模式，使其在介导病毒感染时能够耐受来自不同进化层次物种间序列的差异，实现跨度很大的多物种之间的病毒传播。综上，该研究通过结构生物学手段，结合多种生化方法，首次阐述了多种宿主中进化上相对保守的通用细胞受体通过其多个相似结构域弱相互作用的协同工作与病毒特异性结合，从而介导病毒跨物种入侵的分子机制。

研究工作得到国家重点研发计划、清华大学万科公共卫生与健康学科发展专项基金、国家自然科学基金、清华大学春风基金、北京生物结构前沿研究中心、中科院战略性先导科技专项、中科院基础前沿科学研究计划和中科院青年创新促进会的支持。

[论文链接](#)

研究团队单位：生物物理研究所

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发