

研究利用代谢工程创制“赤晶米”新种质

作者：朱汉斌 方玮 赵秀彩 来源：科学网

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/2567.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

研究利用代谢工程创制“赤晶米”新种质。记者从华南农业大学获悉，该校生命科学学院、亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室刘耀光院士团队利用高效的多基因载体系统TGSII(TransGene Stacking II)，实现了在水稻胚乳特异合成虾青素的营养强化目标，培育出世界首例胚乳富含虾青素的新型功能营养型水稻种质aSTARice，虾青素米，也称赤晶米。相关研究成果10月5日发表在《分子植物》。

据介绍，这是刘耀光院士团队继2017年率先创制富含花青素的功能营养型水稻种质紫晶米后，又一重要科研成果。该系列成果为我国开发、储备了一批营养价值高、色彩丰富的水稻新种质，极大地推动了植物合成生物学和作物生物强化研究领域的发展，表明我校在植物多基因转化技术和复杂代谢途径的基因工程领域继续保持了国际领先水平。

类胡萝卜素是一类重要的植物营养素，而虾青素是一类橙红色类胡萝卜素色素，为类胡萝卜素的最高级形式，具有超强抗氧化活性。目前已在烟草、番茄、土豆、玉米、生菜等植物中实现了虾青素的合成。然而，由于水稻胚乳中完全缺乏类胡萝卜素前体，在水稻胚乳合成有效虾青素的研究仍未见报道。

刘耀光院士团队通过分析水稻类胡萝卜素合成途径基因的表达模式，发现大多数类胡萝卜素合成的相关基因在水稻胚乳中处于不表达或低表达状态。在此基础上，结合对黄金大米(Golden Rice)的分析，确定了八氢番茄红素合成酶基因(sZmPSY1)、八氢番茄红素脱氢酶基因(sPaCrtI)、 β -胡萝卜素酮化酶基因(sCrBKT)和 β -胡萝卜素羟化酶基因(sHpBHY)四个类胡萝卜素合成途径的关键基因，利用水稻胚乳特异性启动子和自主开发的高效多基因TGSII系统，在水稻胚乳中重新构建了不同基因组合的类胡萝卜素/酮式胡萝卜素/虾青素的生物合成途径。

该研究结果表明：双基因(sZmPSY1和sPaCrtI)，三基因(sZmPSY1, sPaCrtI和sCrBKT)和四基因(sZmPSY1, sPaCrtI, sCrBKT和sHpBHY)聚合转化水稻，分别获得了筛选标记删除，富含黄色 β -胡萝卜素的黄金大米、橙红色的角黄素大米和虾青素大米新种质。从而证实，导入上述四个基因的最小组合就能够在水稻胚乳中实现虾青素的从头生物合成，获得富含高抗氧化活性虾青素的虾青素大米。(来源：科学网 朱汉斌 方玮 赵秀彩)

相关论文信息：DOI:<https://doi.org/10.1016/j.molp.2018.09.007>

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发