

---

# 城市环境所在水环境细菌抗生素抗性基因检测分析方法比较研究中获进展

作者：writer 来源：中国科学院

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/7698.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！


近日，中国科学院城市环境研究所杨军研究组的科研成果以 *The impacts of different high-throughput profiling approaches on the understanding of bacterial antibiotic resistance genes in a freshwater reservoir* 为题发表于环境生态领域国际期刊 *Science of the Total Environment* (2019, 693: 133585)。城市环境所研究实习员刘轩、助理研究员肖鹏为共同第一作者，研究员杨军为通讯作者。该研究得到中科院A类战略性先导科技专项、国家自然科学基金和厦门市科技计划的资助。

抗生素抗性基因 (antibiotic resistance genes, ARGs) 是一种新兴环境污染物，可通过水平基因转移等方式进入病原菌并赋予宿主对抗生素的耐药性，从而严重威胁人类的健康。环境中ARGs多样复杂，导致对其全面、系统的定量和定性检测分析难度极大。目前，高通量定量PCR和宏基因组学方法是两种最常用也是应用潜力最大的环境ARGs定性、定量检测手段。然而，在研究水环境ARGs时采用不同ARGs检测方法分析同一份环境样本很可能会得出不同的结果，目前针对ARGs检测方法的比较研究尚十分缺乏，这在一定程度上阻碍了人们对水环境ARGs的客观认知，并极大地限制了检测方法在水环境抗生素耐药性风险监测评估方面的推广应用。

城市环境所水生态健康研究组（杨军团队）以水库细菌为对象，同时采用高通量qPCR技术和宏基因组学技术进行比较研究，分析ARGs时空变化特征、ARGs与细菌类群和环境因子的关系，并对基于不同ARGs检测方法得到的结果进行比较。结果发现，相较于高通量qPCR方法，宏基因组学方法可检出环境中更多的ARGs亚类和更高的杆菌肽类ARGs丰度。基于两种不同的检测方法，发现了相同的ARGs时空动态格局、相似的ARGs与细菌和环境因子的关系，表明使用不同的ARGs检测方法（高通量qPCR和宏基因组学方法）对理解淡水环境细菌抗生素抗性基因动态规律方面的影响较小甚至可忽略不计。高通量qPCR方法具有快速省时、可绝对定量ARGs丰度、对操作人员的生物信息学技能要求较低等优点，但其与宏基因组方法相比，存在PCR扩增偏好性和引物偏好性高、引物依赖性高等缺点。因此，该研究建议在进行日常水环境监测时可选择高通量qPCR方法，以快速获取特定高危害ARGs的定量分析数据，而在对水环境ARGs进行综合性调查时可选择宏基因组学方法以获取更全面的ARGs组成信息。

该研究结果可为研究者在环境ARGs检测分析方法的选择上提供有价值的参考，使其能更科学、更高效地监测和评估水环境抗生素耐药性风险。

[文章链接](#)



文章摘要图

研究团队单位：城市环境研究所

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发