
科学家揭示线粒体自我功能修复新机制

作者：writer 来源：爱科学

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/9232.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

科学家揭示线粒体自我功能修复新机制。中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员刘兴国课题组与武汉大学、中山大学、广州医科大学等多个研究组合作揭示线粒体自我功能修复的全新机制。相关研究4月9日在线发表于《细胞与发育生物学前沿》。

细胞内的线粒体如同群居互助的小精灵，当个别线粒体出现损伤发生能量异常时，可以与其他功能正常的线粒体进行融合得到恢复。而融合的模式——短暂的kiss-and-run，抑或完全融合为一体，是由在内膜上的蛋白OPA1决定的，OPA1如同线粒体社交的情商。然而，损伤的线粒体能否及怎样自我功能恢复呢？

刘兴国课题组发现OPA1的外显子之一4b不依赖于线粒体之间的融合，直接调控线粒体呼吸而恢复自我能量供给。机制研究表明，OPA1外显子4b调控线粒体DNA类核的结构，特异结合线粒体DNA的D-loop区来调控其转录，修复电子传递链，最终恢复线粒体呼吸功能。更重要的是，含有OPA1—Exon4b的剪接体蛋白在肝癌细胞中的表达特异下调，导致肿瘤糖代谢Warburg效应中线粒体能量供给下降。

这一工作使人们对于OPA1在线粒体损伤中的作用有了一个崭新并全面的认识：当线粒体通过社交得到外援而功能恢复，OPA1不含外显子4b的剪接体发挥了情商的决定作用；当线粒体自我功能恢复，OPA1含外显子4b的剪接体发挥了启动作用；当线粒体损伤严重将导致细胞死亡，OPA1则骤然心碎释放内嵴的细胞色素c引发凋亡。这一多层次的调控模式不但在生理发育中发挥重要作用，而且调控了肿瘤等病理代谢转换。

该研究展示了一种OPA1外显子4b介导的不依赖于线粒体融合的全新线粒体功能修复机制，并进一步发现这一类剪接体在肝癌中有助于线粒体代谢转变。（来源：中国科学报朱汉斌 黄博纯）

相关论文信息：<https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00180>

版权声明：凡本网注明来源：中国科学报、科学网、科学新闻杂志的所有作品，网站转载，请在正文上方注明来源和作者，且不得对内容作实质性改动；微信公众号、头条号等新媒体平台，转载请联系授权。邮箱：shouquan@stimes.cn。

作者：刘兴国等 来源：FCDB

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](http://www.iikx.com)转发